

เอกสารคำแนะนำทางวิชาการ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
คำแนะนำเรื่อง การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว

ระวัง! แมลงดำหนามตัวร้ายของสวนมะพร้าว

การป้องกันกำจัด

- 1 ตัดยอด** ที่ถูกแมลงดำหนามทำลายมาเก็บไว้ หมอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย
- 2 ปลอ่ยศัตรูธรรมชาติ**
 - แมลงหางหนีบที่บริเวณยอดมะพร้าว อัตรา 50 ตัวต่อยอด
 - แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสโพนารัม และแตนเบียนเตตระสตักัส บรอนทิสบี อัตรา 5 - 10 มিমี่ต่อไร่ ปลอ่ย 3 - 5 ครั้ง
- 3 ฉีดสารอิมามิกตินเบนโซเอต 1.92% EC** เข้าลำต้น อัตรา 50 มล.ต่อต้น สำหรับมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร (ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาล)
- 4 ราดสารบริเวณยอดและรอบคอมมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร** เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้
 - อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 4 กรัมละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น
 - โทอะมีทอกอกแซม 25% WG อัตรา 4 กรัมละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น
 - ไคโททรีฟูแรน 10% WP อัตรา 10 กรัมละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

กรมส่งเสริมการเกษตร

แหล่งที่มา : ข้อมูล/ภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร



รวบรวมโดย : นายธราทิพย์ ปาวะระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๐ ๘๖๕๐