


คำแนะนำในการป้องกันกำจัดด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วงในแปลงปลูก

ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง (mango seed weevil) อยู่ในวงศ์ Curculionidae อันดับ Coleoptera

๑. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการตัดแต่งกิ่ง กำจัดวัชพืช เศษซากพืช เก็บผลมะม่วงที่ร่วงหล่นไปเผาทำลาย ในกรณีที่ต้นมะม่วงอายุมากกว่า ๑๕ ปี ต้องหมั่นตรวจดูด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วงที่หลบซ่อนตามรอยแตกของเปลือก เพื่อลดแหล่งหลบซ่อนของตัวเต็มวัยของด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง

๒. มีการจัดการให้น้ำ ปุ๋ย และการใช้สารฆ่าแมลงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสวนมะม่วงที่เคยมีประวัติการระบาดของด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วงมาก่อน ควรฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันด้วงวงเจาะเมล็ดตั้งแต่ระยะเริ่มติดผลอ่อน หลังจากช่อดอกโรย โดยฉีดพ่นสารทุก ๆ ๗ วัน จนกว่าจะห่อผลมะม่วง หรือถ้าไม่ห่อผลต้องฉีดสารจนกว่าผลมะม่วงจะเจริญเติบโตอยู่ในระยะเข้าไคล

๓. สารเคมีที่แนะนำให้ใช้คือ สารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด, แลมป์ดาไซฮาโลทริน เพราะสารเคมีจะสลายตัวเร็ว ตกค้างบนผลผลิต (maximum residue limit, MRL) ไม่เกินมาตรฐานการส่งออก



แหล่งที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รวบรวมโดย : นายธราทิพย์ ปาวะระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร