ปฏิทินการผลิตลำไยในฤดูโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตช่วยเพิ่มการออกดอก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะดอกบาน

- งดพ่นยาฆ่าแมลงทุกชนิด

ระยะเจริญพัฒนาของผล

- ให้น้ำสม่ำเสมอ
- ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ต้นละ 0.5-1 กก./ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม
- พ่นแคลซียมคีเลต + ยาฆ่าแมลง สัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อพบการทำลาย

ระยะสะสมอาหาร

- ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 ต้นละ 0.5 – 1 กก./ต้น
- พ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบ สูตร 0-52-34 อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- งดให้น้ำ

ระยะเก็บเกี่ยว

- งดให้น้ำ

ระยะชักนำการออกดอก

- 15 ธ.ค. พ่นสารโพแทสเซียมคลอเรต ครั้งที่ 1 อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- 20 ธ.ค. พ่นสารโพแทสเซียมคลอเรต ครั้งที่ 2 (อัตราเดิม)

ระยะแทงช่อดอก

- พ่นปุ๋ยเกร็ดทางใบสูตร 13-0-46 อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกระตุ้นให้แทงช่อดอกพร้อมกัน
- พ่นแคลซียมโบรอน + ยาฆ่าแมลง สัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อพบการทำลาย

ระยะติดผลอ่อน

- พ่นแคลซียมโบรอน + ยาฆ่าแมลง + ยากำจัดเชื้อรา สัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อพบการทำลาย
- เริ่มให้น้ำ

ระยะสร้างเนื้อ

- ให้น้ำสม่ำเสมอ
- ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ต้นละ 0.5-1 กก. ขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่ม
- พ่นแคลซียมคีเลต + ยาฆ่าแมลง + ยากำจัดเชื้อรา สัปดาห์ละครั้ง
- หยุดพ่นสารเคมีทุกชนิดก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน

ระยะเตรียมต้น

- ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยว
- ใส่ปุ๋ยดอกต้นละ 1 กระสอบ
- ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 + 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 ต้นละ 0.5-1 กก.
- ให้น้ำสม่ำเสมอ
- พ่นยาฆ่าแมลงสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อพบการทำลาย

จัดทำโดย : นายศราวุธ พานทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
27 มกราคม 2566